

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی قزوین
معاونت آموزشی

بیمارستان شفا تاکستان



عنوان: کلونوسکوپی



منبع: پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث

سایت آموزش به بیمار:

Hosshafa.qums.ac.ir

واحد ارتقا سلامت و آموزش همگانی:

۰۲۸۳۵۲۴۹۲۱۱ داخلی ۷۰۳۴

ساعت تماس همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۴

شماره تماس درمانگاه حکیم: ۰۲۸۳۵۲۴۹۲۳۷ از شنبه تا

چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۹ صبح

برداشتن پولیپها و بیوپسی:

پزشک در صورت مشاهده پولیپ در روده بزرگ، آنها را برمیدارد و بعد از اتمام کولونوسکوپی آنها را از نظر بررسی بافت شناسی به آزمایشگاه میفرستد. پولیپ در بزرگسالان شایع است اما اغلب بدون خطر است. با این حال گاهی سرطان روده بزرگ از یک پولیپ شروع می شود. بنابراین برداشتن آنها در جلوگیری از سرطان روده بزرگ موثر است. بیمارانی که بعد از انجام کولونوسکوپی دچار حالات و عوارض زیر شوند باید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهند: درد شکمی - تب - مدفوع خونی - سرگیجه - ضعف

در صورتی که به بیماری هایی مثل هیپاتیت یا ایدز مبتلا هستید، حتما پیش از انجام کولونوسکوپی این موارد را به پزشک خود اطلاع دهید

کلونوسکوپي:

معاینه و بررسی داخل کولون و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی با دستگاه کلونوسکوپ را می‌گویند.

برای اینکار معمولاً ابتدا بیمار با مصرف مسهل یا تنقیه (انما) روده خویش را خالی می‌کند. سپس با دستگاه کلونوسکوپ که لوله‌ای شکل بوده و سر آن دوربینی دارد از راه مقعد وارد روده بزرگ می‌شوند و به بررسی مخاط کولون و راست روده از نظر وجود زخم یا بدخیمی می‌پردازند. کلونوسکوپي روشی است که جهت مشاهده روده بزرگ و راست روده برای تشخیص بافت ملتهب، زخم و رشد غیر طبیعی بافت روده و پولیپ استفاده می‌شود. هنگامیکه بیمار با

مشکلاتی در اجابت مزاج، درد شکم، خونریزی

از مقعد و یا کاهش وزن به پزشک مراجعه می

کند، برای بررسی دقیقتر غالباً به او کلونوسکوپي پیشنهاد می‌شود.

چگونه برای کلونوسکوپي آماده شویم؟

1- از 48 ساعت قبل از انجام کلونوسکوپي فقط مایعات صاف شده میل شود (آب مرغ، سوپ صاف شده، آب میوه، چای، آب و...) .

توجه: در صورت داشتن یبوست مایعات صاف شده از 72 ساعت قبل شروع گردد.

2- هر 4 ساعت 2 عدد قرص بیزاکودیل میل شود (10 صبح، 2 بعد ظهر، 6 بعد از ظهر، 8 شب، 12 شب)

3- هریک بسته پودر پیدرولاکس داخل 4 لیوان آب حل شود و از ساعت 10 صبح روز قبل هر 15 دقیقه یک لیوان میل شود.

4- موهای ناحیه ی مقعد تراشیده و تمیز شود.

5- ساعت 9 صبح ناشتا با همراه مراجعه شود.

نکته: داروهای زیر از داروخانه بیمارستان تهیه شود. (5 بسته پودر پیدرولاکس داخل 20 لیوان آب حل شود، 10 عدد قرص بیزاکودیل تهیه و هر 4 ساعت 2 عدد مصرف شود)

شما باید شرایط پزشکی، همه داروهای مصرفی، ویتامین‌ها، مکمل‌ها و حتی داروهای غیرنسخه‌ای خود را به پزشک اطلاع دهید، از جمله موارد زیر:

➤ آسپرین یا داروهای حاوی آسپرین

➤ داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی

مانند ایبوپروفن یا ناپروکسن

➤ داروهای آرتريت یا آرتروز

➤ داروهای رقیق‌کننده خون

➤ داروهای دیابت

➤ مکمل آهن یا ویتامین‌های حاوی آهن

کلونوسکوپي چگونه انجام می‌شود؟

در طول مدت انجام کلونوسکوپي بیمار روی تخت به پهلو چپ دراز می‌کشد. اغلب، داروی آرامبخش ملایمی به بیمار تزریق می‌شود تا در طول مدت انجام این تست، آرام باشد و دردی احساس نکند. در بعضی موارد هم داروی مسکن قویتری لازم می‌شود. پزشک لوله باریک و قابل انعطاف و بلندی که یک سر آن دوربین تعبیه شده و آغشته به ژل روان کننده است و کلونوسکوپ نام دارد را به آرامی از مقعد وارد راست روده می‌کند. این لوله برای کمک به دید بهتر پزشک، روده بزرگ را با گاز دی اکسید کربن باد می‌کند. دوربین سر لوله، تصاویر روده بزرگ را بر روی صفحه نمایش منتقل می‌کند و پزشک به دقت به بررسی روده می‌پردازد. خونریزی و سوراخ شدن روده بزرگ در حین کلونوسکوپي هرچند از عوارض غیرمعمول است اما دور از ذهن نیست.