

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰


تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی قزوین
معاونت آموزشی

بیمارستان شفا ناکستان

انوکسپارین



برای رژیم غذایی به چه نکاتی توجه کنیم؟

برخی تر کیبات گیاهی (مانند گیاه جین سینگ) و همچنین سبزیجات می توانند بر روی اثرات داروی انوکسپارین، و با توجه به نوع تر کیب اثرات انوکسپارین را زیاد یا کم نماید (قبل از مصرف هر گونه مکمل یا تر کیبات گیاهی حتما با پزشک مشورت نمایید).

منبع: فارماکولوژی مرکز

سایت آموزش به بیمار:

Hosshafa.qums.ac.ir

واحد ارتقا سلامت و آموزش همگانی:

۰۲۸۳۵۲۴۹۲۱۱ داخلی ۷۰۳۴

ساعت تماس همه روزه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

شماره تماس درمانگاه حکیم: ۰۲۸۳۵۲۴۹۲۳۷ از شنبه تا

چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۹ صبح

در صورت مصرف دوز بیش از اندازه چه اقدامی انجام دهم؟

با توجه به خطرات جدی و بروز خون ریزی در استفاده زیاد این دارو در اسرع وقت به بیمارستان و یا مرکز کنترل مسمومیت مراجعه نمایید.

در هنگام مصرف این دارو چه تستی نیاز است؟

برای شروع مصرف این دارو نیاز به آزمایش خاصی نیست اما در صورت بروز خون ریزی پزشک ممکن است آزمایش فاکتور های خونی را در خواست نماید.

در هنگام مصرف انوکسپارین چه داروهایی را نمی

توانم مصرف کنم؟

ایبوبروفن	سلکسیب
ایندومتاسین	مفنامیک اسید
آسپرین	ملوکسیکام
پیروکسیکام	ناپروکسن
دیکلوفناک	هپارین
وارفارین	

انوکسپارین چیست؟

این دارو یک ماده ی ضد انعقاد می باشد که از تشکیل لخته ها جلوگیری می کند

چرا من انوکسپارین مصرف می کنم؟

1- درمان و پیشگیری از لخته های عمیق وریدی که نوعی لخته خون در وریدهای عمقی بدن مانند پا می باشد که ممکن است در پی انجام جراحی، بستری شدن طولانی مدت و بی حرکت ماندن طولانی مدت ایجاد شود
2- آمبولی ریه (وضعیتی که لخته در رگ حرکت کرده و وارد ریه می شود)

3- پیشگیری از آنژین صدری (درد قفسه ی سینه) این دارو ممکن است در موارد دیگری که در این لیست بیان نشده نیز باتوجه به نوع بیماری و نظر پزشکتان مصرف شود . انوکسپارین به شکل آمپولهای ۱۰۰۰، ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰ با نام های تجاری کلکسان، لئونوکس، نوکسپین موجود باشد.



در هنگام مصرف این دارو با چه عوارضی ممکن است مواجهه شوم؟

- مشاهده کپهر، قرمزی، سوزش در پوست، تنگی نفس، ورم در لبها، صورت، زبان و گلو
- خلط خونی، استفراغ خونی، خون در ادرار، مدفوع، خون ریزی از بینی
- اختلال در تکلم، دید و عدم تعادل
- بی حسی وضعف عضلانی
- کبودی بی دلیل یا خون مردگی روی قسمت هایی از بدن

در هنگام مصرف این دارو چه نکاتی را باید رعایت کنم؟

- ❖ در صورت بروز علائم خون ریزی سریعاً به پزشک اطلاع دهید .
- ❖ در صورت وجود بیماری کلیه، کبد، فشارخون بالا، زخم معده و مشکلات بینایی حتماً به پزشک خود اطلاع دهید .
- ❖ در صورت بارداری یا تمایل به بارداری به پزشک اطلاع دهید (مصرف انوکسپارین در بارداری عارضه خاصی بر جنین ندارد اما مواد محافظ در برخی انواع تجاری می تواند تاثیر روی جنین بگذارد)
- ❖ جهت تخلیه بینی فشار زیادی وارد نکنید .
- ❖ از خلال دندان استفاده نکنید از مسواک نرم استفاده نمایید . به جای تیغ از ریش تراش برقی استفاده نمایید .
- ❖ از کار کردن با وسایل تیز و برنده خودداری نمایید .
- ❖ اگر دارو دچار تغییر رنگ شده یا ذرات معلق دارد از مصرف آن خودداری نمایید .
- ❖ از قطع خودسرانه ی دارو خودداری نمایید .
- ❖ دارو را در دمای اتاق و به دور نور نگهداری نمایید.

چگونه این دارو را استفاده نمایم؟

این دارو به صورت زیر پوستی تزریق می شود در صورت عدم آموزش تزریق را خودتان انجام ندهید . تزریق را در حالت نشسته یا خوابیده انجام دهید . از تزریق عضلانی آن خودداری نمایید . محل تزریق را به صورت دوره ای تغییر نمایید . در زمان تزریق با هیچ دارویی مخلوط ننمایید.



در صورت فراموشی یک دوز چه کاری انجام دهم؟

به محض به یاد آوری دوز فراموش شده آن دوز مصرف شود . اگر طبق برنامه به دوز بعدی نزدیک شده اید دوز فراموش شده را رها و برنامه تنظیم شده پزشکتان را ادامه دهید (هرگز به دلیل فراموشی دوز بعدی را افزایش ندهید)