


قولنج کلیه

یک بیماری با درد شدید پهلو بوده و به علت گیر کردن سنگ ادراری در لوله حالب و به دنبال انسداد و تورم کلیه ایجاد می‌شود. در اکثر موارد سنگ‌های کوچک حالب با تجویز مسکن و مصرف مایعات خود به خود دفع می‌شوند ولی در مواردی که سنگ‌ها بزرگتر باشند، می‌توان از روش جراحی TUL از راه مجرا، بدون هیچ‌گونه برشی بر شکم و بی‌هیچ دردی سنگ را خارج نمود.



قبل از جراحی

متخصص بیهوشی قبل از عمل بیمار را مشاوره می‌نماید. آسپرین و سایر داروهای ضد التهاب از چند روز قبل می‌بایست قطع شوند. بیمار می‌تواند صبح روز عمل ناشتا به بیمارستان مراجعه نماید. ولی معمولاً روز قبل بستری شده و از شب قبل ناشتا بوده و سرم تزریقی و آنتی بیوتیک شروع می‌شود.


برای این عمل از روش بی‌حسی نخاعی استفاده می‌شود و در اغلب موارد نیاز به بیهوشی عمومی نیست.

عمل جراحی:

جراح به کمک وسیله‌ای به نام یورتروسکوپ از طریق مجرای ادرار وارد مثانه و سپس لوله حالب شده و بعد از دیدن سنگ به کمک ابزار مخصوص، سنگ را خرد نموده و در این مرحله در صورتی که امکان داشته باشد خرده‌های سنگ، خارج شده و در غیر این‌صورت بسته به نظر جراح ممکن است در داخل لوله حالب لوله‌ای قرار داده شود که توسط یک سوند مثانه ثابت می‌گردد.

بعد از جراحی:

در صورتی که سنگ بیمار به طور کامل خارج شده باشد بیمار بعد از رفع بی‌حسی می‌تواند در همان روز مرخص شود ولی در مواردی که نیاز به گذاشتن لوله حالب وجود دارد، بیمار معمولاً 1 تا 2 روز در بیمارستان اقامت داشته و بعد از خارج کردن لوله حالب مرخص می‌شود.






دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی ولایت

TUL

شکستن سنگ حالب از طریق مجرای ادرار



دفتر پرستاری

واحد آموزش سلامت

بازنگری بهار 1405

- در صورت تب و لرز و یا درد شدید پهلو بایستی به پزشک خود مراجعه نمایید.



- معمولاً دو هفته بعد، طبق دستور پزشک، با یک عکس ساده جهت کنترل، به پزشک خود مراجعه نمایید.

در صورت داشتن سوال در منزل، صبح‌ها ساعت 8 تا 10 با شماره تلفن 50-33790620-028 داخلی 5097 واحد آموزش سلامت تماس بگیرید

(همه روزه به غیر از ایام تعطیل)



مراقبت در منزل:

- معمولاً برای چند روز آنتی‌بیوتیک خوراکی و مسکن تجویز می‌شود
- توصیه می‌شود مایعات زیاد مصرف نمایید.
- جهت کمک به دفع سنگ، فعالیت نموده و حتماً در یک ظرف ادرار نمایید تا در صورت دفع سنگ، آن‌ها را جهت بررسی و آزمایش جمع‌آوری نمایید.
- ممکن است تا چند روز دفع ادرار خون آلود داشته باشید که با خوردن مایعات زیاد برطرف می‌شود.

