

آپاندیسیت:

آپاندیسیت یعنی انسداد آپاندیس که سبب بروز التهاب، تورم، کاهش خونرسانی، نکروز و گاهی اوقات پرفوراسیون (سوراخ شدن آپاندیس) می‌شود. اگر آپاندیسیت درمان نشود، باعث پریتونیت و یا آبسه‌های موضعی می‌شود.

مراحل اولیه:

❑ درد مبهم شکمی در نواحی اطراف ناف

❑ تهوع و استفراغ

❑ تب

❑ حساسیت‌های ناحیه آپاندیس (سمت راست و پایین شکم)

مرحله حاد:

❑ درد در ناحیه تحتانی و راست شکم که با راه رفتن و سرفه کردن بدتر می‌شود

❑ احساس یبوست و اضطراب در دفع

❑ کاهش اشتها

❑ ناخوشی

❑ اسهال، (بعضی اوقات)

درمان: جراحی (آپاندکتومی)

اگر آپاندیس پاره نشده باشد:

- روش لاپاروسکوپی استفاده می‌کنیم: زیر ناف سه یا چهار برش جراحی داده می‌شود و با گذاشتن لاپاروسکوپ، مشاهده و برداشتن آپاندیس انجام می‌شود. (این روش نیاز به بیهوشی و نیازمند یک شب بستری شدن در بیمارستان دارد)

- روش جراحی شکمی: در ربع تحتانی راست شکم، برش جراحی داده می‌شود. این عمل تحت بیهوشی عمومی انجام می‌شود و نیازمند 2 روز بستری شدن در بیمارستان است.

اگر آپاندیس پاره شده باشد:

- درن در محل گذاشته می‌شود و بیمار به مدت 5 روز یا بیشتر در بیمارستان بستری می‌شود.

آموزش:

علائم و شکایاتی که باید بعد از عمل به پزشک و پرستار گزارش دهید (مشاهده محل برش جراحی از نظر):

☐ قرمزی

☐ تورم

☐ تندرنس (درد)

☐ گرمی پوست در لمس

☐ خروج ترشحات چرکی

- از فعالیت سنگین و خم شدن تا دو ماه پرهیز نمایید.

- از بلند کردن اشیاء بیش از 4.5 کیلوگرم برای 6 هفته اول پرهیز کنید. (مدت زمان کمتر برای روش لاپاروسکوپی)






دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

قزوین

مرکز آموزشی درمانی ولایت

آپاندیسیت



دفتر پرستاری

واحد آموزش سلامت

بازنگری بهار 1405

- تا دو هفته از غذاهای پر فیبر مانند آلو، سبزیجات و میوه‌های تازه به غیر از موز، انار و سیب استفاده نمایید.

- تا دو هفته از غذاهای نفاخ مانند نوشابه، دوغ گازدار، کلم و نخود استفاده نکنید.
- در صورت طبیعی بودن و نداشتن ترشح در زخم 48 ساعت بعد، می‌توانید حمام کنید.

- پانسمان را روزانه تعویض نمایید.
- داروهای تجویز شده را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- در زمان تعیین شده حتماً به پزشک مراجعه کنید.
- جواب آزمایش را در زمان تعیین شده پیگیری نمایید.

در صورت داشتن سوال در منزل، صبح‌ها ساعت 8 تا 10 با شماره تلفن 028-33790620-50 داخلی 5097 واحد آموزش سلامت تماس بگیرید

(همه روزه به غیر از ایام تعطیل)



- در هنگام خستگی استراحت نمایید و به صورت تدریجی فعالیت‌ها افزایش دهید.

- فعالیت‌های عادی‌تان را 4 هفته بعد از جراحی شروع نمایید.
- از حمام کردن در وان اجتناب نمایید. (دوش گرفتن منعی ندارد)
- پس از ترخیص، فعالیت‌های روزانه را با فواصل استراحت می‌توانید شروع کنید
- مایعات فراوان مصرف نمایید. (به شرط عدم محدودیت مصرف مایعات)

- تا دو هفته از مواد حاوی ویتامین A, C, K مانند گوجه، ماست پروبیوتیک، ماهیچه، لبنیات کم چرب، طالبی، انبه و زردآلو استفاده کنید.

