

بازتوانی در بیماران ریه


راه اندازی زود هنگام بیماران و استفاده از ورزش های اولیه به منظور جلوگیری از ضعف و کاهش توده عضلانی ناشی از کم تحرکی به دنبال بستری طولانی مدت و به منظور افزایش توان تنفسی ضروری به نظر می رسد .

بیماران باید تمرینات خود را از هنگام بستری در بیمارستان در حد نشستن و برخاستن از روی صندلی و راه رفتن با کمک و یا به تنهایی شروع کنند .

بیمارانی که از بیمارستان مرخص می شوند یا به صورت سرپایی درمان شده اند جهت دریافت مشاوره به بخش بازتوانی ریه ارجاع داده می شوند .

بازتوانی ریه شامل :

- ✓ اقدامات فیزیوتراپی
- ✓ ورزش های تنفسی به منظور تقویت عضلات تنفسی
- ✓ آموزش تنفس دیافراگمی
- ✓ نحوه سرفه موثر
- ✓ آموزش تنفس لب غنچه ای
- ✓ نحوه انجام دق و خروج ترشحات
- ✓ مداخلات تغذیه ای
- ✓ حمایت های روانی - اجتماعی می باشد .



توصیه های لازم در جهت انجام فعالیت های روزانه

- تنظیم فعالیت ها براساس تحمل بیمار باشد.
- فعالیت سنگین نباشد .
- برای پیشگیری از خستگی بین فعالیت استراحت کند و قبل از انجام فعالیت دم عمیق انجام دهد .
- توصیه می شود پس از مصرف داروها ، تمرینات تنفسی و ورزش انجام شود.

در صورت بروز عوارض جانبی و علائم خطر نظیر :

- ✓ تنگی نفس در حالت استراحت
- ✓ تنگی نفس شدید پس از فعالیت
- ✓ سرگیجه
- ✓ سبکی سر
- ✓ تپش قلب
- ✓ درد قفسه سینه بازتوانی متوقف شود .

توصیه های لازم قبل از شروع تمرینات

- ✓ استفاده از لباس مناسب ، گشاد و راحت
- ✓ استفاده از کفش ورزشی و ترجیحا کفش بدون بند
- ✓ خوردن غذا دو ساعت قبل از تمرینات
- ✓ مصرف روزانه 8-10 لیوان آب
- ✓ مصرف داروها قبل از انجام تمرینات

تغذیه در زمان بازتوانی

- ☞ تمرینات تنفسی دو ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا انجام شود.
- ☞ مصرف غذای پرپروتئین و پر کالری به مقدار کم و دفعات مکرر
- ☞ غذاهای غنی از پتاسیم مثل موز ، پرتغال ، آلو ، کشمش ، مصرف کند .

☞ غذاهای نفاخ و پر حجم مصرف نکنید (مثل لوبیا ، کلم ، حبوبات)

☞ وزن خود را در محدوده نرمال نگه دارید .


☞ مصرف روزانه 8-10 لیوان آب

☞ بهداشت دهان را رعایت نمایید.

تنفس شکمی

برای تنفس شکمی یک دست را روی قفسه سینه و یک دست را روی شکم قرار دهید و از طریق بینی طوری نفس بکشید که دست روی شکم بالا بیاید و سپس لب ها را غنچه کرده و به شکل فوت کردن و آرام هوای ریه را تخلیه کنید .

این تمرین 3-4 بار تکرار کنید و سپس استراحت کنید این الگو را میتوانید در وضعیت های مختلف نشسته ایستاده و راه رفتن تمرین کنید.



نیمه سرفه

نفس عمیق بکشید تا جایی که امکان دارد سعی کنید کل ریه ها پر از هوا شود 3-5 ثانیه هوا را حبس کنید .دهان را باز کنید و به صورت " ها " کردن هوا را به بیرون خارج کنید .(مثل ها کردن شیشه)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت



با نظارت و تایید :

دکتر مریم قرانتي

فوق تخصص ریه - فلوشیپ خواب

دکتر فاطمه عبدالرزاقی

متخصص طب فیزیکی

بازنگری بهار 1405

چون پشت سر هم بودن باعث بسته شدن راه هوایی می شود .

در صورت بروز علائم تنگی نفس فزاینده ، ضعف ، سردرد خلط خونی ، انجام تمرینات تنفسی متوقف شود.


تمرینات تحریک کننده قفسه سینه فوقانی

تمرین اول

در حالت نشسته و راحت قرار بگیرید (در صورت لزوم بالشتی پشت کمر خود قرار دهید) دست ها را به جلو و بالا حرکت دهید . همزمان با بازدم دست ها را پایین آورده و در هنگام دم دست ها را به جلو و بالا بکشید .

تمرین دوم

در حالت نشسته هر دو دست خود را پشت گوش قرار داده و همزمان با بازدم دست ها را جلوی قفسه سینه به هم نزدیک کرده و همزمان با دم دست ها را از هم دور کنید .



در صورت داشتن سوال در منزل، 8 تا 14 با شماره

تلفن 27-028-33790620 داخلی 5097 واحد

آموزش سلامت تماس بگیرید.

تنفس لب غنچه ای

در یک حالت راحت قرار بگیرید و یک نفس عمیق توسط بینی بکشید و سپس به آرامی در حالیکه لب ها را جمع کرده اید بازدم انجام دهید (مانند فوت کردن)



سرفه موثر و آموزش نحوه تخلیه وضعیتی ترشحات

راست بنشینید و به آرامی از راه بینی عمل دم را انجام دهید و در موقع بازدم در حالی که به جلو خم شده اید سرفه کوتاه و مکرر انجام دهید . در این حالت ترشحات به قسمت بالای سیستم تنفس وارد می شود . سپس با سرفه ترشحات را خارج کنید . توصیه می شود قبل از این کار داروهای استنشاقی برونکو دیلاتور یا رقیق کننده خلط طبق نظر پزشک استفاده کنید .

آموزش نحوه انجام دق و ارتعاش قفسه سینه

دق باعث کنده شدن ترشحات غلیظ و چسبنده می شود جهت انجام دق دست به شکل فنجان در آورده شود و ضربه های ملایم و منظم بر دیواره قفسه سینه روی نواحی مورد نظر ریه وارد شود. دق و ارتعاش در هر وضعیت 3-5 دقیقه انجام شود . سرعت و شدت ضربات زیاد نباشد . (پشت سر هم نباشد)