

بیمار عزیز :

این آزمون امکان معاینه مجاری تنفسی شما را توسط یک وسیله کوچک و باریک به نام برونکوسکوپ فراهم می سازد. پزشک شما می تواند هر گونه تنگی و یا اختلال موجود در مجاری تنفسی شما را توسط دوربینی که به انتهای وسیله نصب شده است ، مشاهده نماید . همچنین توسط این وسیله پزشک می تواند از بافت مجاری تنفسی شما نمونه برداری کند و یا اجسام خارجی و یا ترشحات مجاری تنفسی را خارج سازد .



قبل از آزمون :

- از ۸ ساعت قبل از آزمون از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. از تقریباً ۲۴ ساعت قبل از آزمون از نوشیدنی های حاوی الکل استفاده نکنید .
- دندان های مصنوعی، لنزهای تماسی و جواهرات خود را خارج کنید.
- بلافاصله قبل از آزمون برای بی حسی گلو و توقف رفلکس اوغ زدن بی حس کننده موضعی داده میشود. این کار به پیشرفت برونکوسکوپ به داخل تراشه شما کمک خواهد کرد.
- قبل از انجام آزمون علائم حیاتی شما کنترل خواهد شد .
- در بسیاری از موارد با تزریق داروی خواب آور و آرام بخش برونکوسکوپی انجام می شود .

حین انجام آزمون :

- این آزمون ۱۵-۱۰ دقیقه به طول می انجامد. شما در وضعیت خوابیده به پشت یا نیمه نشسته قرار خواهید گرفت.

بعد از تاثیر داروهای بی حسی، برونکوسکوپ از طریق بینی و یا دهان به داخل مجاری تنفسی شما هدایت خواهد شد. توام با جلو راندن برونکوسکوپ مقدار کمی داروی بی حس کننده به منظور کاهش سرفه و تحریک راه های تنفسی به داخل مجاری تنفسی اسپری می شود . در خاتمه کار ، زمانی که پزشک معاینه دستگاه تنفسی را تکمیل کرد برونکوسکوپ را خارج خواهند ساخت .



پس از آزمون :

- برای کنترل اینکه شما احساس راحتی کنید ، مراقب بهداشتی زیر سر شما را بالا می برد. یک تا دو ساعت بعد از آزمون وضعیت شما به دقت کنترل خواهد شد . تا زمانی که اثر بی حسی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی ولایت

برونکوسکوپی



دفتر پرستاری

واحد آموزش سلامت

بازنگری: تابستان ۱۴۰۵

در صورت داشتن سوال در منزل، ساعت ۸ تا ۱۴ با شماره تلفن

028-33790620 داخلی 5097 واحد آموزش سلامت

تماس بگیرید. (همه روزه بجز ایام تعطیل)

با آرزوی سلامتی و بهبودی

برطرف نشده است از خوردن و آشامیدن
یا مصرف داروهای خوراکی اجتناب
کنید.

- گاهی ممکن است به طور موقت دچار گرفتگی صدا یا گلو درد شوید. برای رفع این مشکل بعد از بازگشت رفلکس حس گلو، برای شما مسکن تجویز میشود.
- گاهی بعد از آزمون یک عکس قفسه سینه از شما گرفته خواهد شد.
- ممکن است بعد از آزمون تا چند ساعت خلط خونی داشته باشید. اگر خلط خونی زیاد شد به مراقب بهداشتی اطلاع دهید.
- به مدت ۶-۸ ساعت بعد از آزمون از استعمال دخانیات خودداری کنید.
- در صورت بروز تنگی نفس، خس خس و درد قفسه سینه فوراً به مراقب بهداشتی خود اطلاع دهید.